

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19

Introducción

El Coronavirus 2019 (COVID 2019) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARSCoV-2, el cual se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales.

Para reducir el impacto de las condiciones del brote del COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, aislamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación.

Definiciones:

Covid-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

SARS CoV 2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de nombrar a los nuevos virus.

Prueba confirmatoria por laboratorio para COVID-19: Es la prueba de detección de ácidos nucleicos y la prueba confirmatoria para los casos de COVID-19. Se basa en la detección del ácido nucleico (ARN) del SARSCoV-2 mediante ensayos de RT-PCR. Este tipo de pruebas pueden tener alta sensibilidad y especificidad y son las indicadas por la OMS y OPS para realizar la confirmación diagnóstica de COVID-19.

Pruebas rápidas: Se trata de pruebas que pueden realizarse por diversas metodologías y de acuerdo con el tipo de prueba tienen diferente capacidad diagnóstica, tienen ciertas características en común: tiempo de ejecución 20 minutos o menos (por eso su denominación de rápidas), necesitan equipamiento mínimo, pueden realizarse fuera de un laboratorio y tienen incorporados sistemas de control de calidad interno.

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.

Aislamiento: Separación de una persona o un grupo de personas que se sabe o se creen que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación del COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la unidad sanitaria.

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tiene por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o el producto final de dichos procedimientos no atenten contra la seguridad de los trabajadores.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas.

Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentran entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos.

Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o a la boca.

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.

Normatividad asociada

- **Resolución 502 de 2020/24 de marzo de 2020.** Por la cual se adoptan los lineamientos para la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-Cov2 (Covid19)
- **Resolución 536 de 2020/31 de marzo de 2020.** Por la cual se adopta el plan de acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-Cov2 (Covid19)
- **Resolución 666 de 2020.**

Lineamientos

- **GIPS07** Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia.
- **ASIF04** Prevención de riesgos ocupacionales en la gestión de expedición de licencias de seguridad y salud en el trabajo y la gestión de los prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo, frente al SARS-CoV-19.
- **PSS01** Plan de acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-19.

Medidas de bioseguridad generales:

En la IPS Almavid Salud como medida para la contención de la transmisión del virus se tienen las siguientes medidas generales:

- Lavado de manos
- Distanciamiento social
- Uso de tapabocas

En concordancia con los lineamientos del Ministerio de salud, particularmente el **ASIF04** *“Prevención de riesgos ocupacionales en la gestión de expedición de licencias de seguridad y salud en el trabajo y la gestión de los prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo, frente al SARS-CoV-19”*, no se realizaría prueba complementaria de espirometrías, por ser esta una práctica susceptible como fuente de contagio, toda vez, que de acuerdo con los CDC (2020b), la propagación ocurre principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias y contactos cercanos, por lo tanto no se realizará, hasta tanto sea declarada la superación de la emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

El personal de la IPS Almavid Salud que debe gozar de buena salud y no presentar comorbilidades que afecten su respuesta inmunológica, así como no presentar síntomas de infección respiratoria (tos, fiebre, estornudos, etc.), es por ello que diariamente se realiza encuesta de sintomatología como tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y se toma la temperatura con termómetro infrarrojo.

Los trabajadores asistenciales, incluyendo el personal de admisiones, utiliza tapabocas, careta protectora, bata limpia anti fluido no estéril de manga larga y el personal asistencial utiliza guantes.

La encuesta de sintomatología también es aplicada a los pacientes junto con un compromiso de cumplir con las medidas generales (lavado de manos, distanciamiento social y uso de tapabocas), además se realiza aplicación de solución a base de alcohol para desinfección de manos, aplicación de amonio cuaternario en suelas de zapatos y toma de temperatura.

Calle 53 C Sur # 43-74 - PBX: 322 05 01

Envigado – Antioquia

www.almavidsalud.com

Durante la jornada laboral, se hará énfasis en las medidas de bioseguridad generales por medio de parlanteo, el guión es el siguiente:

“Tenga en cuenta las siguientes medidas de bioseguridad:

-Lavado de manos: lavarse las manos es la mejor forma de combatir el coronavirus, frotando las palmas, dedos y nudillos con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta el 50% el riesgo de contraer el virus.

-Distanciamiento social: mantenga distancia de 2 metros entre las personas

-Uso de tapabocas: el tapabocas debe usarse de manera continua en las instalaciones, recuerde que este debe ir sobre la nariz y por debajo del mentón

- No salude de beso, abrazo, ni de la mano.

-Intente no tocar superficies, a no ser que sea estrictamente necesario.

Estas medidas nos ayudan a disminuir el riesgo de contagio.”

Medidas de precaución adicionales, considerando mecanismos de transmisión:

Por gotas: Este hace referencia a las gotas generadas por los pacientes durante la tos, estornudos o al hablar. La transmisión se produce cuando las gotas que contienen el virus de la persona infectada, son impulsadas a corta distancia a través del aire y estas se depositan en los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.

Transmisión por Contacto: Considerado como una forma de transmisión del nuevo coronavirus (nCoV-2019), a todo contacto que puedan tener las personas con objetos utilizados en la atención médica del paciente contaminado con el nuevo coronavirus (nCoV-2019).

Por Aerosoles: Además, es posible que se propague por este mecanismo en aquellos procedimientos generadores de aerosoles como broncospia, aspirado nasofaríngeo o procedimientos para la toma de muestras de secreciones de la vía aérea.

En la IPS Almaid Salud se realiza desinfección con alcohol al 70% de las manos de las personas que ingresan y se desinfectan los zapatos con amonio cuaternario, además se realiza una encuesta de condiciones de salud para indagar a las personas al momento de su ingreso y conocer presencia de síntomas respiratorios, en caso de presentar más de dos síntomas se da aviso a la empresa y el colaborador no es atendido.

Lavado de manos

- Al ingreso a las instalaciones de la IPS Almaid Salud todos los colaboradores deberán realizar lavado de manos con agua y jabón.
- Todos los colaboradores deben realizar protocolo de lavado de manos que debe durar entre 20 a 30 segundos. El área de admisiones realiza lavado de manos cada hora y el

Calle 53 C Sur # 43-74 - PBX: 322 05 01

Envigado – Antioquia

www.almavidsalud.com

personal asistencial realiza lavado de manos por cada paciente o cuando hace un cambio de actividad.

- El personal asistencial debe realizar lavado y/o desinfección de manos (alcohol) idealmente entre cada atención.
- El lavado de manos debe hacerse después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas (manijas, pasamanos, cerraduras), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.
- En todos los puestos de trabajo se dispone de alcohol al 70% para la higienización de manos y objetos usados para la prestación del servicio.

Técnica de lavado de manos

- El lavado de manos con agua y jabón debe hacerse cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.
- La higiene de manos con alcohol se debe realizar siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias.

Distanciamiento físico

Los colaboradores de la IPS Almavid Salud deben permanecer al menos a 2 metros de distancia, tanto en el ambiente de trabajo como en las zonas comunes y en cualquier lugar en el que se tenga encuentro con otras personas.

Pasos para colocación y retiro de tapabocas

1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
2. Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara.
3. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.
4. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional: La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.
5. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firme.
6. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación.
7. El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua.

Calle 53 C Sur # 43-74 - PBX: 322 05 01

Envigado – Antioquia

www.almavidsalud.com

8. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte externa de la mascarilla.
9. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.

Uso de careta facial

- Realizar lavado de manos de acuerdo al protocolo de la OMS para manipular la máscara facial.
- No toque la máscara sin antes haberse hecho un lavado de manos.
- Al inicio de la jornada y después de terminada lave la máscara con solución jabonosa para retirar polvo y películas de grasa.
- Higienice de manera habitual la máscara protectora con alcohol al 70%.
- El uso de la máscara es de carácter personal, no la comparta con otros compañeros.
- Siempre use otras medidas de protección personal: higiene de manos, mantener la distancia entre las personas y uso del tapabocas.
- Al terminar la jornada colóquela en un lugar que previamente haya desinfectado.

Elementos de protección individual:

- Toda persona que ingrese a la IPS Almavid Salud se debe desinfectar las manos con alcohol.
- Los colaboradores que ingresen a la IPS Almavid Salud deberán hacer uso correcto del tapabocas y se prohíbe el uso de guantes por alto riesgo de contaminación (es un vehículo que puede transportar el virus)
- Los colaboradores deben abstenerse de compartir los elementos de protección personal.

Limpeza y desinfección

La limpieza de los consultorios está a cargo de cada uno de los profesionales, quienes deben velar porque todos los insumos usados sean limpiados y desinfectados con alcohol. Se debe usar el alcohol para limpiar superficies, equipos, lapiceros y equipos biomédicos reusables.

La auxiliar de servicios generales, utilizando todos los elementos de protección personal, deberá realizar desinfección del consultorio con una periodicidad de 2 horas, con hipoclorito de sodio para desinfectar pisos y con alcohol para desinfectar superficies, equipos, lapiceros y equipos biomédicos reusables.

Responsabilidades del área de admisiones

- Lavarse las manos antes de la jornada, siguiendo los pasos recomendados por la Organización mundial de la salud.
- Solicitar tapabocas desechable en el área técnica de manera diaria.

Calle 53 C Sur # 43-74 - PBX: 322 05 01

Envigado – Antioquia

www.almavidsalud.com

- Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral, realizando un buen uso del mismo: manipularlo desde los elásticos, no tocarlo, no llevarse las manos a la cara, si va a manipular el tapabocas debe lavarse las manos antes y después, ajustar tapabocas cubriendo desde la nariz hasta el mentón.
- Realizar limpieza y desinfección de la máscara protectora con el alcohol del kit personal.
- Usar de manera diaria y durante toda la jornada laboral el tapabocas y la máscara protectora.
- Usar solo un equipo de cómputo y no sentarse en el puesto de trabajo del compañero.
- Realizar limpieza y desinfección con alcohol cada vez que un paciente haga uso del lapicero, firmero o huellero.
- Desinfectar con alcohol cualquier implemento que use un paciente.
- Realizar lavado de manos al menos una vez cada 2 horas.
- Realizar limpieza y desinfección de equipos de cómputo, celulares, cocedoras, impresora, lapiceros, barras del módulo y demás utensilios al menos una vez cada hora.
- Realizar limpieza de los lapiceros ubicados en la barra una vez cada hora.
- Asegurar que los pacientes hagan un buen uso de la mascarilla protectora: uso tapando la nariz y cubriendo mentón.
- Asegurar el distanciamiento de pacientes en sala de espera.
- Realizar desinfección de manos de los pacientes con alcohol, en caso de que las manos se vean visiblemente sucias, se debe promover el lavado de manos siguiendo el protocolo de la OMS.
- Practicar encuesta de sintomatología, en caso de tener respuestas positivas, dar aviso al área técnica.
- Reportar al área administrativa cualquier contagio que se llegue a presentar en su lugar de trabajo o familia.
- Adoptar medidas de auto cuidado y reportar al área administrativa cualquier alteración de su estado de salud.

Responsabilidad médicos laborales

- Lavarse las manos antes de la jornada, siguiendo los pasos recomendados por la Organización mundial de la salud.
- Solicitar tapabocas desechable en el área técnica de manera diaria.
- Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral, realizando un buen uso del mismo: manipularlo desde los elásticos, no tocarlo, no llevarse las manos a la cara, si va a manipular el tapabocas debe lavarse las manos antes y después, ajustar tapabocas cubriendo desde la nariz hasta el mentón.
- Realizar limpieza y desinfección de la máscara protectora con el alcohol del kit personal.
- Usar de manera diaria y durante toda la jornada laboral el tapabocas y la máscara protectora.
- Realizar desinfección con alcohol de los equipos biomédicos utilizados entre cada paciente.
- Desinfectar con alcohol cualquier implemento que use un paciente.

Calle 53 C Sur # 43-74 - PBX: 322 05 01

Envigado – Antioquia

www.almavidsalud.com

- Realizar lavado de manos antes de atender un paciente y después de atender un paciente.
- Usar guantes por cada paciente.
- Correr la tela de camilla entre paciente y paciente.
- Suministrar bata a cada paciente y posterior promover que se deseche.
- Realizar limpieza y desinfección de equipos de cómputo, celular y escritorio al menos una vez cada hora.
- Asegurar que los pacientes hagan un buen uso del tapabocas: tapando la nariz y cubriendo mentón.
- Al hacer uso de la chapa de la puerta, desinfectarla con alcohol.
- Asegurar que en el consultorio haya suministro de guantes jabón, toallas y alcohol, en caso de requerir elementos de aseo debe solicitarlos al área administrativa.
- Reportar al área administrativa cualquier contagio que se llegue a presentar en su lugar de trabajo o familia.
- Adoptar medidas de auto cuidado y reportar al área administrativa cualquier alteración de su estado de salud.

Responsabilidad fonoaudiólogos

- Lavarse las manos antes de la jornada, siguiendo los pasos recomendados por la Organización mundial de la salud.
- Solicitar tapabocas desechable en el área técnica de manera diaria.
- Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral, realizando un buen uso del mismo: manipularlo desde los elásticos, no tocarlo, no llevarse las manos a la cara, si va a manipular el tapabocas debe lavarse las manos antes y después, ajustar tapabocas cubriendo desde la nariz hasta el mentón.
- Realizar limpieza y desinfección de la máscara protectora con el alcohol del kit personal.
- Usar de manera diaria y durante toda la jornada laboral el tapabocas y la máscara protectora.
- Desinfectar las manos del paciente con alcohol, por si deben manipular algo implemento dentro de la cabina.
- El profesional debe hacer manipulación de la cabina, para abrir y cerrar, disminuyendo el contacto del paciente con las manijas de la puerta.
- Asegurar que el paciente use el tapabocas a un estando dentro de la cabina.
- Realizar desinfección con alcohol de otoscopio, diadema de vía aérea, vía ósea, silla de la cabina entre paciente y paciente.
- Desinfectar con alcohol cualquier implemento que use un paciente.
- Desinfectar la cabina entre paciente y paciente con alcohol.
- Realizar lavado de manos antes de atender un paciente y después de atender un paciente.
- Realizar limpieza y desinfección de equipos de cómputo, celular y escritorio al menos una vez cada hora.

Calle 53 C Sur # 43-74 - PBX: 322 05 01

Envigado – Antioquia

www.almavidsalud.com

- Asegurar que los pacientes hagan un buen uso del tapabocas: tapando la nariz y cubriendo mentón.
- Al hacer uso de la chapa de la puerta, desinfectarla con alcohol.
- Asegurar que en el consultorio haya suministro de jabón, toallas y alcohol, en caso de requerir elementos de aseo debe solicitarlos al área administrativa.
- Reportar al área administrativa cualquier contagio que se llegue a presentar en su lugar de trabajo o familia.
- Adoptar medidas de auto cuidado y reportar al área administrativa cualquier alteración de su estado de salud.

Responsabilidad optómetras

- Lavarse las manos antes de la jornada, siguiendo los pasos recomendados por la Organización mundial de la salud.
- Solicitar tapabocas desechable en el área técnica de manera diaria.
- Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral, realizando un buen uso del mismo: manipularlo desde los elásticos, no tocarlo, no llevarse las manos a la cara, si va a manipular el tapabocas debe lavarse las manos antes y después, ajustar tapabocas cubriendo desde la nariz hasta el mentón.
- Realizar limpieza y desinfección de la máscara protectora con el alcohol del kit personal.
- Usar de manera diaria y durante toda la jornada laboral el tapabocas y la máscara protectora.
- Desinfectar las manos del paciente con alcohol, por si deben manipular algún implemento.
- Desinfectar con alcohol cualquier implemento que use un paciente.
- Realizar lavado de manos antes de atender un paciente y después de atender un paciente.
- Realizar desinfección con alcohol de los equipos biomédicos utilizados entre cada paciente.
- Realizar limpieza y desinfección de equipos de cómputo, celular y escritorio al menos una vez cada hora.
- Usar guantes en el momento que entre en contacto físico con el paciente u otro objeto del mismo.
- Asegurar que los pacientes hagan un buen uso del tapabocas: tapando la nariz y cubriendo mentón.
- Al hacer uso de la chapa de la puerta, desinfectarla con alcohol.
- Asegurar que en el consultorio haya suministro de jabón, toallas y alcohol, en caso de requerir elementos de aseo debe solicitarlos al área administrativa.
- Reportar al área administrativa cualquier contagio que se llegue a presentar en su lugar de trabajo o familia.
- Adoptar medidas de auto cuidado y reportar al área administrativa cualquier alteración de su estado de salud.

Calle 53 C Sur # 43-74 - PBX: 322 05 01

Envigado – Antioquia

www.almavidsalud.com

Responsabilidad bacteriólogos

- Lavarse las manos antes de la jornada, siguiendo los pasos recomendados por la Organización mundial de la salud.
- Solicitar tapabocas desechable en el área técnica de manera diaria.
- Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral, realizando un buen uso del mismo: manipularlo desde los elásticos, no tocarlo, no llevarse las manos a la cara, si va a manipular el tapabocas debe lavarse las manos antes y después, ajustar tapabocas cubriendo desde la nariz hasta el mentón.
- Realizar limpieza y desinfección de la máscara protectora con el alcohol del kit personal.
- Usar de manera diaria y durante toda la jornada laboral el tapabocas y la máscara protectora.
- Desinfectar las manos del paciente con alcohol, por si deben manipular algún implemento.
- Desinfectar con alcohol cualquier implemento que use un paciente.
- Realizar lavado de manos antes de atender un paciente y después de atender un paciente.
- Realizar desinfección con alcohol a las sillas y mesas auxiliares de toma de muestras.
- Realizar desinfección de los equipos utilizados mínimo 1 vez cada 2 horas.
- Realizar limpieza y desinfección de mesones al iniciar y al terminar la jornada.
- Realizar limpieza y desinfección de equipos de cómputo, celular y escritorio al menos una vez cada hora.
- Usar guantes en el momento que entre en contacto físico con el paciente u otro objeto del mismo.
- Asegurar que los pacientes hagan un buen uso del tapabocas: tapando la nariz y cubriendo mentón.
- Al hacer uso de la chapa de la puerta, desinfectarla con alcohol.
- Asegurar que haya suministro de jabón, toallas y alcohol, tanto en toma de muestras como en el laboratorio, en caso de requerir elementos de aseo debe solicitarlos al área administrativa.
- Reportar al área administrativa cualquier contagio que se llegue a presentar en su lugar de trabajo o familia.

Responsabilidad auxiliar de servicios generales

- Lavarse las manos antes de la jornada, siguiendo los pasos recomendados por la Organización mundial de la salud.
- Solicitar tapabocas desechable en el área técnica de manera diaria.
- Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral, realizando un buen uso del mismo: manipularlo desde los elásticos, no tocarlo, no llevarse las manos a la cara, si va a manipular el tapabocas debe lavarse las manos antes y después, ajustar tapabocas cubriendo desde la nariz hasta el mentón.
- Realizar limpieza y desinfección de la máscara protectora con el alcohol del kit personal.

Calle 53 C Sur # 43-74 - PBX: 322 05 01

Envigado – Antioquia

www.almavidsalud.com

- Usar de manera diaria y durante toda la jornada laboral el tapabocas y la máscara protectora.
- Desinfectar con alcohol cualquier implemento que use un paciente.
- Realizar lavado de manos antes y después de realizar tareas de limpieza y desinfección.
- Las superficies de los baños deben limpiarse y desinfectarse cada 3 horas.
- Utilizar alcohol al 70% para desinfectar superficies de manera constante.
- Realizar recolección de residuos de manera permanente, utilizando los elementos de protección personal propios de la tarea.
- Realizar limpieza y desinfección de consultorios 1 vez cada 3 horas.

Limpeza y desinfección de consultorios

Realizar la limpieza y desinfección de áreas y superficies en donde se ubicó el paciente durante la estancia en la IPS y tan pronto se retire el paciente de dicha zona.

Realizar limpieza y desinfección del material de trabajo todos los días, limpiar, enjuagar con agua y posteriormente desinfectar con alcohol.